

SOBRE LA PRESENCIA DE *NARCISSUS SCABERULUS* HENRIQ. (AMARYLLIDACEAE) EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL (ESPAÑA)

**Javier LÓPEZ TIRADO¹, Azucena NÚÑEZ ÁLVAREZ,
Manuel Isaías CARMONA RUIZ & Pablo J. HIDALGO FERNÁNDEZ**

Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública. Facultad de Ciencias Experimentales, Campus de El Carmen, Universidad de Huelva, 21071-Huelva
¹javier.lopez@dbasp.uhu.es

RESUMEN: Se cita por primera vez para Andalucía occidental *Narcissus scaberulus* Henriq., concretamente de la provincia de Huelva. **Palabras clave:** Corología, Amaryllidaceae, *Narcissus scaberulus*, Andalucía occidental, España.

ABSTRACT: On the presence of *Narcissus scaberulus* Henriq. (Amaryllidaceae) in western Andalusia (Spain). *Narcissus scaberulus* Henriq. is recorded for the first time in western Andalusia, specifically from the province of Huelva. **Key words:** Chorology, Amaryllidaceae, *Narcissus scaberulus*, western Andalusia, Spain.

Narcissus scaberulus, perteneciente a la sect. *Apodanthi* A. Fern., es una especie que se distribuye de manera muy rara en la Península Ibérica. Concretamente se presenta en las provincias de Almería, Badajoz (sub. *N. calcicola* Mendoça), Granada y Málaga en España; y Algarve, Beira Alta, Beira Litoral, Estremadura y Ribatejo en Portugal (PÉREZ CHISCANO, 1981; AEDO, 2013).

Se ha encontrado una pequeña población de este taxon en la provincia de Huelva, comportándose como rupícola sobre cuarcitas (Fig. 1), lo que supone la primera cita para Andalucía occidental.

***Narcissus scaberulus* Henriq.**

Huelva: 29SPB5863, Puebla de Guzmán, ermita de la Virgen de la Peña, 315 m, 16-I-2014 (López Tirado (MA 880561)).

Recientemente, *N. calcicola* ha sido considerada como subespecie de *N. sca-*

berulus debido a que las diferencias entre ambos taxones son sutiles y con solapamiento (AEDO, 2013). La población que se da a conocer, teniendo en cuenta las claves de *Flora iberica*, presenta individuos con una anchura de corona que encaja con *N. scaberulus* subsp. *scaberulus*, si bien la longitud de los tépalos externos encaja mejor con *N. scaberulus* subsp. *calcicola*. De este modo, desde un punto de vista más conservador, los autores consideran la población onubense como *N. scaberulus* s.l.

Sería necesario un estudio más profundo para dilucidar el *status* de estos taxones, ya que si se encuentra un continuo en la variación de los caracteres morfológicos, habría que reconsiderar la opción de tratarlo todo como una especie variable sin taxones infraespecíficos (AEDO, com. pers.).



Fig. 1: *Narcissus scaberulus* Henriq., en la nueva población de Puebla de Guzmán (Huelva).

BIBLOGRAFÍA

- AEDO, C. (2013) *Narcissus* L. in CASTRO-VIEJO, S. (coord.). *Flora iberica* 20: 340-397. Real Jardín Botánico. C.S.I.C. Madrid.
- PÉREZ CHISCANO, J. L. (1981) Primeras citas para España de *Narcissus calcicola* Mendonça. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(1): 301-302.

(Recibido el 6-II-2016)

(Aceptado el 2-IV-2016)