Flora Montiberica 75: 3-7 (XI-2019) ISSN 1138-5952 – eISSN 1988-799X

DOS NUEVOS NARCISOS HÍBRIDOS EN EL OCCIDENTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Antonio GONZÁLEZ[1], Santiago PATINO SÁNCHEZ[2], Juan Pedro SOLÍS[1] & Pello URRUTIA URIARTE[1]

[1] Herbario Digital Xavier de Arizaga (HDXA). Instituto Alavés de la Naturaleza. Apdo. 2092. 01080. Vitoria-Gasteiz (Álava). huetoabajo29@gmail.com

[2] Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao. Calle Los Baños 55, Bajo, apdo. 48910-Sestao (Vizcaya). patinosanti@gmail.com

RESUMEN: Se describen las nuevas especies híbridas *Narcissus* ×*villasrubiensis* González, Patino, Solís & Urrutia [*N. triandrus* L. subsp. *pallidulus* (Graells)] Rivas Goday × *N. vitekii* P. Escobar] y *Narcissus* × *galaicus* González, Patino, Solís & Urrutia (*N. cyclamineus* DC. × *N. triandrus* L. subsp. *triandrus*). **Palabras clave:** *Amaryllidaceae*; *Narcissus*; hibridación; taxonomía; Salamanca; Orense; España.

ABSTRACT: Two new *Narcissus* in Western Iberian Peninsula. *Narcissus* ×*villasrubiensis* González, Patino, Solís & Urrutia [*N. triandrus* L. subsp. *pallidulus* (Graells)] Rivas Goday × *N. vitekii* P. Escobar] and *Narcissus* × *galaicus* González, Patino, Solís & Urrutia (*N. cyclamineus* DC. × *N. triandrus* L. subsp. *triandrus*) are described. **Keywords:** *Amaryllidaceae*; *Narcissus*; hybridization; taxonomy; Spain.

En el curso de las campañas de herborización de narcisos por el occidente de la Península Ibérica para ir completando nuestro conocimiento y la visión global de las distintas especies del género (tan necesaria para hacer una interpretación cabal del mismo), nos percatamos de la existencia de un par de híbridos novedosos que a continuación pasamos a describir:

Narcissus* ×*villasrubiensis González, Patino, Solís & Urrutia (*N. triandrus* subsp. *pallidulus* (Graells) Rivas Goday × *N. vitekii* P. Escobar), **nothosp. nova** (fig. 1)

Diagnosis: *Species hybrida inter parentes media. Difert a N. vitekii, floribus colore flavio palidiore, corona longiore, 6-7 mm longa, minus cylindrica atque petalis angustioribus, longis et manifeste reflexis. Difert quoque a N. triando subsp. pallidulo, floribus minoribus, horizontalibus, non nutantibus, solitariis cum colore alvio flaviori atque tepalis brevioribus tubo.*

Holotypus: Hs, SALAMANCA: 29TQE0545565834, Villasrubias, Sierra de Villasrubias, Pico del Moro, 1181 m, pastos pedregosos silíceos, 9-III-2019, *González, Patino, Solís & Urrutia* (SESTAO 25117; HDXA7982)

Observaciones: Especie híbrida de características intermedias entre las de sus especies parentales. De *N. vitekii* difiere por tener flores de color amarillo más pálido, con la corona más larga, de unos 6-7 mm, no tan cilíndrica y tépalos más estrechos, largos y netamente reflejos. De *N. triandrus* subsp. *pallidulus* difiere por sus flores en general menores, horizontales y no nutantes, solitarias, de color amarillo más intenso y tépalos mucho más cortos que el tubo.

El nombre asignado hace referencia a la Sierra de Villasrubias, Salamanca, territorio donde habita la planta y próxima al lugar natal de un miembro del equipo.

Las especies progenitoras coinciden sólamente en la Sierra de Gata y otras sierras aledañas, donde habitan el endemismo, recientemente descrito, *N. vitekii* (ESCOBAR, 2018) y el siempre prolífico *N. triandrus* subsp. *pallidulus*.

Además de la nothovar. *villasrubiensis*, con flores más próximas a *N. vitekii,* conocemos del mismo lugar el híbrido conjugado más próximo a *N. triandrus* ssp. *pallidulus*, que pasamos a continuación a describir:

Narcissus* ×*villasrubiensis nothovar. ***maurensis*** González, Patino, Solís & Urrutia, **nothovar. nova** (fig. 2)

Diagnosis: *Difert haec species a nothovar. typica quod plus quam unam florem habet atque heae nutantes sunt.*

Holotypus: Hs, SALAMANCA: 29TQE0545565834, Villasrubias, Sierra de Villasrubias, Pico del Moro, 1181 m, pastos pedregosos silíceos, 9-III-2019, *González, Patino, Solís & Urrutia* (SESTAO 25118 ; HDXA 7983).

Observaciones: Difiere de la nothovar. típica por tener más de 1 flor y ser éstas nutantes.

El nombre asignado hace referencia al Pico del Moro, en la Sierra de Villasrubias, aneja a la Sierra de Gata, donde encontramos esta planta. Su área no debe exceder mucho estas sierras, donde habita el endemismo *N. vitekii.*

Siguiendo la ruta a través de Portugal llegamos a Galicia donde en las alisedas del río Cerves, en la provincia de Orense, descubrimos el siguiente híbrido:

Narcissus* ×*galaicus González, Patino, Solís & Urrutia (*N. cyclamineus* DC. × *N. triandrus* L. subsp. *triandrus*) **nothosp. nova** (fig. 3)

Diagnosis: *Species hybrida inter parentes media, tamen similior N.triandro subsp. triandro. Haec species difert corona proportione angustiore et longiore, apice curvatulus in exteriorem et crenatiore. Tepalis quoque reflexioribus et affixis tubo, lanceolatis, cum apice non mucronato. Difert a N. cyclamineo floribus albidis non solitariis et longius pedicellatis, corona breviore et minore quam tepalis, et difert quoque staminibus et stylo exsertis.*

Holotypus: Hs, ORENSE: 29TNG6467279855, Melón, Pozas de Melón, río Cerves, 500 m, ecotono entre soto fluvial y brezal argomal, silíceo.14-III-2019, *González, Patino, Solís & Urrutia* (SESTAO 25127; HDXA 7984).

Observaciones: Especie híbrida de características intermedias a las de sus especies parentales, aunque más próxima en este caso a *N. triandrus* subsp. *triandrus*. De

esta especie difiere por su corona proporcionalmente más estrecha y larga, de ápice algo recurvado hacia el exterior y más crenado. Por sus tépalos más reflejos y pegados al tubo, lanceolados, de ápice no mucronado. De *N. cyclamineus* difiere por las flores de color blanquecino, no solitarias y más largamente pediceladas, por la corona más corta y de menor tamaño que los tépalos y por los estambres y estilo exertos.

El nombre de la nothoespecie hace referencia a Galicia, tierra de encuentros, de plantas y de personas, donde compartimos una jornada inolvidable con Luisa María, Marisol y Manolo que nos enseñaron las poblaciones más emblemáticas de narcisos en el entorno de Lalín y nos indicaron la posible presencia de este híbrido en su variante más próxima a *N. cyclamineus* en el río Arnego, en Agolada, parroquia de Carmoega.

La distribución de esta planta debe estar limitada al área de *N. cyclamineus* que es la que tiene una área de distribución más restringida, limitándose a Galicia y NW de Portugal, donde coinciden ambas.

N. cyclamineus se hibrida también con *N. minor* subsp. *minor* (SILVA-PANDO, 2015) descrito del río Arnego como *N.* ×*dezanus* García Mart. & Silva-Pando y con *N. bulbocodium* subsp. *bulbocodium* (RIBEIRA & al., 2007) descrito del río Alcofra, en la Sierra de Caramulo (Portugal) y que posiblemente pueda estar presente en Galicia, pues coinciden sus especies parentales y donde ha de buscarse.

AGRADECIMIENTOS: A Rita Carbajo, siempre dispuesta a echarnos una mano con el latín y a Javier Valencia, conservador del herbario SESTAO.

BIBLIOGRAFÍA

ESCOBAR GARCÍA, P. (2018) A new species of *Narcissus* sect. *Apodanthi* (Amaryllidaceae) from the western Iberian Peninsula. *Phytotaxa* 345 (2): 143-151.

RIBEIRO, P., PAIVA, J. & FREITAS, H. (2007) *Narcissus* × *caramulensis* (Amaryllidaceae), a new hybrid for the portuguese flora. *Anales Jard. Bot. Madrid 64(1)*: 43-46.

SILVA-PANDO, F.J. (2015) *Narcissus* × *dezanus* García Mart. & Silva-Pando (Amaryllidaceae). Especie nueva para la Península Ibérica. *Candollea* 70: 5-7.

(Recibido el 15-V-2019
Aceptado el 6-VI-2019)

Fig. 1. *Narcissus ×villasrubiensis* nothovar. *villasrubiensis*. Holotypus. (SESTAO 25117; HDXA 7982).

Fig. 2. *Narcissus ×villasrubiensis* nothovar. *maurensis*. Holotypus. (SESTAO 25118; HDXA 7983).

Fig. 3. *Narcissus ×galaicus*. Holotypus (excepto foto inferior dcha.) (SESTAO 25127; HDXA 7984).