met een lagere dosering gewerkt.



NARCIS

Bollenteelt

Onkruidbestrijding met bentazon Gebruik ter bestrijding van onkruid Basagran (bentazon). Een flink aantal onkruidsoorten wordt hiermee bestreden zoals herderstasje, kamille, kleefkruid, kleine brandnetel, muur, perzikkruid (roodbeen), wilde wikke en zwarte nachtschade.
Basagran bestrijdt melganzevoet (meelbomen) slecht en gras wordt niet gedood. Basagran is een contactmiddel en werkt het beste als de plantjes twee tot vier blaadjes hebben. Goede omstandigheden voor een bespuiting zijn:
• een temperatuur tussen 12°C en 20°C; • toepassing tegen de avond bij warm weer; • groeizaam weer; • het spuiten op een droog gewas; regen drie tot vijf uur na de bespuiting vermindert de werking.
Basagran is ook te gebruiken in geparteerde narcissen.
Er dient rekening te worden gehouden met de cultivargevoeligheid. Bijvoorbeeld 'Tête à Tête' en 'Peeping Tom' zijn gevoelig.
Dosering: 3 liter per ha in 400 - 500 liter water; druppelgrootte: midden.
Opmerkingen:
• Basagran wordt alleen in narcissen gebruikt. In andere gewassen geeft dit middel zware schade; • een bespuiting met Basagran kan zonder schade worden herhaald; • gebruik niet meer dan 500 l. water per ha. Bij grotere hoeveelheden loopt een deel van het middel met het water van het onkruid af. Naarmate er minder water gebruikt wordt, is de kans op drift groter. Drift resulteert in een minder goede onkruidbestrijding en de kans op schade aan naastgelegen gewassen neemt toe; - Basagran is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Bloementeelt

Rooidatum en vroegbloeibehandeling Rooi voor zeer vroege bloei (eind november tot begin december) de bollen eind juni tot begin juli. Vroeg rooien gaat wel ten koste van de opbrengst.
Rekening moet worden gehouden met een gewichtsverlies van 25%. Dit komt ook doordat vroeg gerooide bollen sterk indrogen. De broeikwaliteit van vroeg gerooide bollen is minder dan van later gerooide bollen. Een goede kwaliteit voor vroegbloei is alleen te bereiken door dikke bollen te gebruiken. Alleen voor vroege bloei eind juni - begin juli rooien. Voor kerstbloei is het beter om rond 15 juli te rooien.
Later rooien levert dikkere bollen op en in de kas een betere kwaliteit. De temperatuurbehandeling na het rooien is één week 34°C, twee weken 17°C, daarna koelen bij 9°C. Bij zeer vroeg rooien kan het zinvol zijn de 34°C-behandeling te verlengen tot veertien dagen.
Door de bollen eerst goed te drogen vermindert het risico op aantasting door Rhizopus (zachtrot) tijdens de 34°C-behandeling. Als de bollen één week buiten liggen trek dan deze periode van de tussentemperatuur van twee weken 17°C af.
De behandeling wordt dan als volgt: één week buiten , één week 34°C , één week 17°C , koeling bij 9°C. De tussentemperatuur van 17°C is zeer belangrijk voor de kwaliteit. Het bekorten of weglaten ervan geeft risico's van bloemverdroging (klappers) en een slechtere kwaliteit vooral bij vroegbloei.
Geschikte cultivars voor vroegbloei zijn onder andere 'Yellow Sun', 'Gigantic Star', 'Barrett Browning', 'Fortune', 'Ellen', 'Early Glory' en 'Helios'.
Houd er rekening mee dat de 34°C-behandeling pas ingaat als het produkt 34°C is, dit kan soms wel enige dagen duren.

TULP

Bollenteelt

Vuurbestrijding In deze periode is geen nieuw blad meer gevormd. Een vuurbestrijding is alleen nodig als door slechte weersomstandigheden het gewas is beschadigd en de planten lang nat blijven. Bij droog weer is de noodzaak om tegen vuur te spuiten niet aanwezig. De sterkste vuurbestrijding wordt verkregen als wordt gespoten met een combinatie van middelen.
Gebruik per ha een combinatie van:
• één basismiddel (onder andere 2,5 kg zineb/maneb, 1 l Shirlan of 1,5 kg Allure) • één specifiek middel (onder andere 0,25 l vinchlozolin 500 g/l of 0,25 l Simisclex) • één sys-